



CHELATED
TRACE
ELEMENTS

SPECIAL
FERTILIZERS



Your advanced solutions partner



Société chimique française privée dont le siège est à Paris, **Protex International** est financièrement indépendante et entend le rester. La société définit et met en œuvre ses propres politiques et stratégies, réinvestissant ses ressources internes afin d'assurer son développement à moyen et long terme sans avoir à prendre en compte l'intérêt d'actionnaires recherchant un profit à court terme.

Protex International appartient au petit nombre de sociétés chimiques globales de taille moyenne à la fois capables d'être compétitives mondialement et de faire preuve de flexibilité et de réactivité pour prendre des décisions rapides grâce à une organisation efficace.

Protex International est composée d'une fédération de petites entreprises (centres de profit) qui sont proches des marchés locaux et bénéficient des ressources centrales du groupe (finances, fiscalité, R&D, etc.). Ceci permet de conserver une réactivité optimale tout en bénéficiant d'une organisation centrale structurée.

Protex International investit chaque année 6 % de son chiffre d'affaires en R&D au sein de ses 6 centres de recherches (France, USA, Corée du Sud, Chine, Italie et Espagne) ainsi que dans le cadre de nombreuses coopérations avec des centres de recherche externes, universités ou de contrats industriels.

La R&D du groupe s'articule autour de deux axes: études pour répondre aux besoins spécifiques des clients, et études à moyen et long terme destinées à améliorer la qualité et le coût des produits existants, à la mise au point de nouveaux produits, et à l'amélioration de la sécurité des procédés.

FERQUICK W.G.....	4
FERQUICK L.....	6
FERFIT L.....	8
FERHIDROX L.....	10
FERAPID L.....	12
MANRAPID L.....	14
ZINRAPID L.....	16
BORAPID L.....	18
CURAPID L.....	20
RAPICAL P.....	22
RAPIMAG L.....	24
MICRO COMBI.....	26
COMBI 22.....	28
COMBI 70.....	30
COMBI HYDRO.....	32
COMBI UVE.....	34
BLOOMCOMBI.....	36
FENK.....	38
FRUTOS K.....	40
FRUTOSPRINT.....	42
FRUTOSTARTER.....	44
FRUTOSTAR.....	46
ACTIRON K.....	48
ACTIRON CUPRO.....	50
ACTIRON SULFO.....	52
UREAMIN.....	54
AMINOSTAR.....	56
ALGAPROX.....	58
VITALGAN.....	60






ENGRAIS CE

CHÉLATE DE FER (EDDHSA)

Composition:

- Fer (**Fe**) soluble dans l'eau: 6 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDDHSA: 6 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-10
- Formulation: microgranulé

le pH du sol et la disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Ferquick W.G., grâce à la composition particulière et novatrice de la molécule chélatante EDDHSA, présente une formulation très efficace dans la prévention et la correction de la chlorose ferrique.

Il est conseillé dans le traitement des cultures qui présentent une carence en fer. Celle-ci se manifeste par le jaunissement des jeunes feuilles, la nécrose du bord des feuilles et des branches terminales ainsi que par une faible production constituée de fruits de petit calibre.

Le fer participe à l'élaboration de la chlorophylle, est le catalyseur de nombreuses enzymes et intervient dans la réduction des nitrates.

Cultures sensibles à la carence en fer: Poirier, Pommier, Vigne, Pêcher, Agrumes, Kiwi.

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'effectuer le traitement au départ de la végétation ; les meilleurs résultats sont obtenus par:



• APPLICATION DIRECTE DANS LE SOL.

Dissoudre le produit dans l'eau et l'appliquer au sol autour des racines. Bien l'incorporer dans le sol et l'arroser abondamment.



• APPLICATION PAR GOUTTE À GOUTTE.

Il est recommandé de l'appliquer en deux étapes:

1. avant la floraison: 60 % de la dose.
2. lors de la croissance du fruit: 40 % de la dose.

Ou diviser la dose en fonction du nombre de fertirrigations programmées.



• APPLICATION PAR INJECTION DANS LE SOL.

Effectuer 5-8 injections par plante, dans le sol à environ 30 cm de profondeur.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



JEUNES PLANTS: 25 - 50 g/pied
PLANTS EN PRODUCTION: 50 - 100 g/pied

Agrumes



JEUNES PLANTS: 30 - 60 g/pied
PLANTS EN PRODUCTION: 100 - 200 g/pied
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 75 - 100 g/pied

Vigne



TRAITEMENT PRÉVENTIF: 10 - 20 g/pied
TRAITEMENT CURATIF: 30 - 40 g/pied

Fraises



TRAITEMENT PRÉVENTIF: 0,5 g/pied
TRAITEMENT CURATIF: 1 - 1,5 g/pied

Horticulture



JEUNES PLANTS: 2 - 4 g/m²
PLANTS EN PRODUCTION: 2 - 4 g/m²
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 2 - 4 g/m²
TRAITEMENT CURATIF: 2 - 4 g/m²

Fleurs

Plantes d'ornement Serres



JEUNES PLANTS: 2 - 4 g/m²
PLANTS EN PRODUCTION: 2 - 4 g/m²
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 2 - 4 g/m²
TRAITEMENT CURATIF: 2 - 4 g/m²

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 10 x 1 kg, 4 x 5 kg et 1 x 15 kg dans boîtes cartonnées.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE




ENGRAIS CE

CHÉLATE DE FER (EDDHSA)

Composition:

- Fer (Fe) soluble dans l'eau.....2,2 % p/p
- Fer (Fe) chélaté avec EDDHSA: 2,2 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-10
- Formulation: liquide

le pH du sol et la disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Ferquick L, grâce à la composition particulière et novatrice de la molécule chélatante EDDHSA, constitue une formulation très efficace dans la prévention et la correction de la chlorose ferrique.

Ferquick L est conseillé sur les cultures qui présentent une carence en fer. Celle-ci se manifeste par le jaunissement des jeunes feuilles, la nécrose du bord des feuilles et des branches terminales ainsi que par une faible production constituée de fruits de petit calibre.

Le fer participe à l'élaboration de la chlorophylle, est le catalyseur de nombreuses enzymes et intervient dans la réduction des nitrates.

Cultures sensibles à la carence en fer: Poirier, Pommier, Vigne, Pêcher, Agrumes, Kiwi.

Produit spécialement indiqué pour la fertirrigation.

MODE D'EMPLOI

Il est recommandé d'effectuer le traitement dès le début de la végétation. Pour obtenir une meilleure efficacité, utiliser le produit comme suit:



• APPLICATION DIRECTE DANS LE SOL.

Diluer le produit dans l'eau et le distribuer régulièrement autour des racines. L'incorporer au sol et l'arroser abondamment.



• APPLICATION PAR GOUTTE À GOUTTE.

Il est recommandé de l'appliquer en deux étapes:

1. avant la floraison: 60 % de la dose.
2. lors de la croissance du fruit: 40 % de la dose.

Ou diviser la dose par le nombre de fertirrigations programmées.



• APPLICATION PAR INJECTION DANS LE SOL.

Effectuer 5-8 injections par plante dans le sol, à environ 30 cm de profondeur.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



JEUNES PLANTS: 40 - 80 ml/pied
PLANTS EN PRODUCTION: 80 - 160 ml/pied

Agrumes



JEUNES PLANTS: 50 - 100 ml/pied
PLANTS EN PRODUCTION: 140 - 220 ml/pied
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 100 - 150 ml/pied

Vigne



TRAITEMENT PRÉVENTIF: 15 - 30 ml/pied
TRAITEMENT CURATIF: 50 - 70 ml/pied

Fraises



TRAITEMENT PRÉVENTIF: 1 ml/pied
TRAITEMENT CURATIF: 2 ml/pied

Horticulture



JEUNES PLANTS: 3 - 6 ml/m²
PLANTS EN PRODUCTION: 3 - 6 ml/m²
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 3 - 6 ml/m²
TRAITEMENT CURATIF: 3 - 6 ml/m²

Fleurs

Plantes d'ornement Serres



JEUNES PLANTS: 3 - 6 ml/m²
PLANTS EN PRODUCTION: 3 - 6 ml/m²
TRAITEMENT PRÉVENTIF: 3 - 6 ml/m²
TRAITEMENT CURATIF: 3 - 6 ml/m²

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 l et 20 l.


ENGRAIS CE

CHÉLATE DE FER (DTPA)

Composition:

- Fer (Fe) soluble dans l'eau: 3,1 % p/p
- Fer (Fe) chélaté avec DTPA: 3,1 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-8
- Formulation: liquide

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Ferfit L est une formulation particulière possédant une efficacité biologique élevée dans la prévention et le traitement des carences ferriques.

Son exceptionnelle stabilité le rend particulièrement indiqué pour les traitements par voie foliaire.

Ferfit L corrige la chlorose ferrique très rapidement.

Le fer participe à l'élaboration de la chlorophylle, est le catalyseur de nombreuses enzymes et intervient dans la réduction des nitrates.

La carence en fer (ou chlorose) se manifeste par le jaunissement des jeunes feuilles, la nécrose du bord des feuilles et des branches terminales ainsi que par une faible production constituée de fruits de petit calibre.

Cultures sensibles à la carence en fer: Poirier, Pommier, Vigne, Pêcher, Agrumes, Kiwi.

MODE D'EMPLOI



- Fortement recommandé par voie foliaire.
- Les traitements doivent être entrepris dès les premiers symptômes de chlorose et répétés 3-4 fois en fonction de la nécessité et des résultats visuels déjà obtenus.

- Il est conseillé d'effectuer les applications dans les heures les plus fraîches de la journée et quand la partie foliaire de la plante a atteint un développement suffisant pour une absorption appropriée du produit.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

140 - 220 ml/hl

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

140 - 220 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

140 - 220 ml/hl

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

220 ml/hl

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

140 - 220 ml/hl

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE
TRAITEMENT CURATIF

140 - 220 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1l, 5 l et 20 l.

Produit également disponible en poudre soluble.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS CE

SOLUTION D'ENGRAIS À BASE DE FER (HEDTA)

Composition:

- Fer (**Fe**) soluble dans l'eau: 4,5 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec HEDTA: 4,5 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7

le pH du sol et la disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Ferhidrox L est une nouvelle formulation liquide à la base de fer chélaté avec HEDTA. L'utilisation de l'agent chélatant HEDTA permet d'obtenir un produit avec une bonne plage de stabilité et garantissant une absorption rapide par la plante.

Ferhidrox L est une formulation particulièrement indiquée pour la préparation de solutions nutritives pour cultures hydroponiques.

Le fer participe à l'élaboration de la chlorophylle, est le catalyseur de nombreuses enzymes et intervient dans la réduction des nitrates.

Cultures sensibles à la carence en fer: Poirier, Pommier, Vigne, Pêcher, Agrumes, Kiwi.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

100 - 150 ml/hl

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:

70 - 100 ml/hl

APPLICATION HYDROPONIE: 18 ml dans 1000 lt
(pour obtenir 1ppm de Fer)

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- En préparation de solutions nutritives.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS CE

SOLUTION D'ENGRAIS À BASE DE FER (EDTA)

Composition:

- Fer (Fe) soluble dans l'eau: 6% p/p
- Fer (Fe) chélaté avec EDTA: 6% p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4 - 7,5
- Formulation: liquide

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Ferapid L présente une formulation et une composition particulières qui le rendent adapté à la prévention et au traitement de la chlorose ferrique, moyennant des applications soit par voie racinaire soit par voie foliaire.

Le fer participe à l'élaboration de la chlorophylle, est le catalyseur de nombreuses enzymes et intervient dans la réduction des nitrates.

Cultures sensibles à la carence en fer: Poirier, Pommier, Vigne, Pêcher, Agrumes, Kiwi.

Ferapid L est aussi recommandé pour la préparation de solutions hydroponiques.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 2 - 3,5 l/ha

Agrumes



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 2 - 3,5 l/ha

Vigne



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 2 - 3,5 l/ha

Fraises



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 1 - 2,5 l/ha

Horticulture



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 1 - 2,5 l/ha

Fleurs Plantes d'ornement



- APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
- APPLICATION FERTIRRIGATION: 1 - 2,5 l/ha

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

Produit également disponible en poudre soluble.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE


ENGRAIS CE

CHÉLATE DE MANGANÈSE (EDTA)

Composition:

- Manganèse (**Mn**) soluble dans l'eau: 6,2 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 6,2 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5
- Formulation: liquide

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Manrapid L, est un sel de manganèse totalement chélaté par EDTA. Il est recommandé pour une nutrition adaptée des agrumes, rosiers et betteraves.

Le manganèse intervient dans de nombreuses réactions enzymatiques, dans la photosynthèse et dans la phase de transformation des nitrates.

Une carence en manganèse, principalement sur les jeunes feuilles, provoque des symptômes semblables à la chlorose ferrique, avec chlorose des nervures.

Lors de graves insuffisances, on constate une décoloration des feuilles qui deviennent grises et rabougries.

Manrapid L prévient et corrige la carence en manganèse.

Cultures sensibles à la carence en manganèse: Pommier, Poirier, Pêcher, Vigne, Agrumes, Kiwi, Tomate, Fraises, Betterave.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé par voie foliaire.
- Comme source de manganèse en préparation de solutions nutritives.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE: 180 - 220 ml/hl

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE: 180 - 220 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE: 180 - 220 ml/hl

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE: 70 ml/hl

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE: 70 ml/hl

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE: 70 ml/hl

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE: 70 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1l et 5 l.

Produit également disponible en poudre soluble.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE


ENGRAIS CE

CHÉLATE DE ZINC (EDTA)

Composition:

- Zinc (Zn) soluble dans l'eau: 9,5 % p/p
- Zinc (Zn) chélaté avec EDTA: 9,5 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5
- Formulation: liquide

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Zinrapid L est une solution de zinc totalement chélatée avec EDTA, de concentration élevée pour la correction et la prévention de la carence en zinc sur agrumes et fruits, ainsi que pour cultures industrielles (Maïs, etc.).

Le zinc participe à l'élaboration du Tryptofan précurseur des auxines. Il est notamment présent dans le métabolisme de l'azote.

La carence en zinc se manifeste de manière prédominante sur les jeunes feuilles et entraîne une croissance ralentie.

Les feuilles forment des rosettes qui tombent très tôt. Les fruits sont petits et peu nombreux.

Cultures sensibles à la carence en zinc: Maïs, Agrumes, Vigne, Salades.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE: 90 - 120 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 10 - 15 ml/pied

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE: 90 - 120 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 10 - 15 ml/pied

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE: 90 - 120 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 10 - 15 ml/pied

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE: 60 - 90 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 5 - 10 ml/pied

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE: 60 - 90 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 5 - 10 ml/pied

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE: 60 - 90 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 5 - 10 ml/pied

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE: 60 - 90 ml/hl
APPLICATION FERTIRRIGATION: 5 - 10 ml/pied

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 5 l et 20 l.

Produit également disponible en poudre soluble.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE


ENGRAIS CE

CORRECTEUR DE LA CARENCE EN BORE

Composition:

- Formulation liquide de bore ethanolamine, contenant:
- Bore (**B**) soluble dans l'eau: 11 % p/p (150 g/litre)

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Borapid L est utilisé comme source de bore en préparation de solutions nutritives et pour la correction de la carence en bore en horticulture, fruiticulture et autres cultures en général.

La carence en bore se manifeste, par un développement racinaire réduit, la nécrose et mort des apex méristématiques des tiges et racines ainsi que l'absence de développement des bourgeons floraux, la réduction des entre-nœuds, la présence de fruits déformés et de petite taille.

Le bore intervient dans la fertilisation du pollen; il stimule le transport des sucres et favorise la fixation de l'azote dans les légumineuses.

Cultures sensibles à la carence en Bore: Pommier, Poirier, Vigne, Olivier, Betterave, Asperge.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application foliaire: conseillée en mélange avec un tensio-actif.

- Le produit est miscible avec la plupart des engrais et produits phytosanitaires, excepté le sulfate de manganèse, le sulfate de zinc et les produits de réaction alcaline.

DOSE D'EMPLOI

Vergers Vigne Agrumes



EPOQUE: Avant la floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 100 ml/hl
APPLICATION FOLIAIRE (pommes, poires): 50 - 70 ml/hl
FERTIRRIGATION: 3 - 4 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 2 - 3

Oliviers



EPOQUE: Avant la formation du fruit
APPLICATION FOLIAIRE: 140 - 180 ml/hl
FERTIRRIGATION: 3,5 - 4 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 1 - 2

Betterave et Tournesol



EPOQUE: A partir de la troisième feuille
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 3,5 - 4 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 1 - 2

Fraises



EPOQUE: Floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 50 - 70 ml/hl
FERTIRRIGATION: 1 - 2 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 1 - 2

Fleurs Plantes d'ornement



EPOQUE: A la reprise de la végétation
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 100 ml/hl
FERTIRRIGATION: 2 - 3,5 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 1 - 2

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE


ENGRAIS CE

CHÉLATE DE CUIVRE (EDTA)

Composition:

- Cuivre (**Cu**) soluble dans l'eau: 9,1 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 9,1 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée 4-7,5
- Formulation: liquide

le pH du sol et la
disponibilité en éléments



CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Curapid L est recommandé pour la correction des carences en cuivre en horticulture, fruiticulture et autres cultures en général.

Le produit est rapidement absorbé par la plante tant par voie racinaire que par voie foliaire.

L'élément Cu contribue à la synthèse de la chlorophylle et d'autres pigments, et participe au métabolisme des protéines et des carbohydrates.

Cultures sensibles à la carence en cuivre: Blé, Orge, Maïs.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé par voie foliaire.
- Comme source de cuivre en préparation de solutions nutritives.

DOSE D'EMPLOI

Vergers Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

40 - 100 ml/hl

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:

40 - 70 ml/hl

Oliviers



TRAITEMENT CURATIF:

70 - 120 ml/hl

Horticulture Fraises



TRAITEMENT CURATIF:

40 - 70 ml/hl

Cultures Industrielles



TRAITEMENT CURATIF:

40 - 100 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1l et 5l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

CHÉLATE DE CALCIUM

Composition:

- Formulation en poudre soluble de calcium chélaté (CaEDTA) contenant:
- Calcium (**Ca**) soluble dans l'eau:..... 10 % p/p (14% **CaO**)
- Calcium (**Ca**) chélaté avec EDTA: 10 % p/p

CARACTÉRISTIQUES

Calcium totalement chélaté avec EDTA.

Cette forme confère au **Rapical P** une grande stabilité et une remarquable capacité de pénétration dans les tissus du végétal.

Le calcium augmente l'élasticité de la paroi cellulaire. La carence en calcium se manifeste dans les apex végétatifs par la nécrose des tissus.

Rapical P prévient et corrige la carence en calcium provoquée par le déséquilibre dans l'assimilation de cet élément.

Dans le cas du pommier (variété Golden), au-delà de la prévention du "Bitter Pit", il présente une bonne activité préventive face à certaines manifestations d'origine physiologique (chute précoce des feuilles, pourrissement...).

Pour les cultures horticoles sensibles à la carence en calcium (Tomate, Poivron, Melon, Concombre), il assure un contrôle efficace de la pourriture des terminaisons, du vieillissement et de la pourriture des feuilles.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE: 80 - 100 g/hl

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE: 100 g/hl
FERTIRRIGATION: 2 - 3 kg/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE: 100 g/hl
FERTIRRIGATION: 5 kg/ha

Fleurs



APPLICATION FOLIAIRE: 80 g/hl

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES
NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

CHÉLATE DE MAGNÉSIUM

Composition:

- Magnésium (**Mg**) soluble dans l'eau:.....2,5 % p/p (**MgO** 4,1 %)
- Magnésium (**Mg**) chélaté avec EDTA:..... 2,5 % p/p
- Formulation: liquide

CARACTÉRISTIQUES

Magnésium totalement chélaté avec EDTA. Cette forme particulière favorise l'absorption du magnésium par voie foliaire et racinaire.

Rapimag L prévient et corrige les carences en magnésium dues à un manque de cet élément ou à des déséquilibres avec d'autres éléments nutritionnels comme le calcium et le potassium.

Le magnésium est une composante essentielle de l'élaboration de la chlorophylle et un activateur de nombreux processus enzymatiques ; il intervient dans la formation des sucres.

La carence en magnésium se manifeste sur les vieilles feuilles.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé par voie foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

170 - 250 ml/hl

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:

170 - 250 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

170 - 250 ml/hl

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE:

140 - 200 ml/hl

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:

140 - 200 ml/hl

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:

140 - 200 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE



ENGRAIS CE

MÉLANGE DE MICRO-ÉLÉMENTS CHÉLATÉS

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Bore (**B**) soluble dans l'eau: 1,30 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 0,45 % p/p
- Magnésium (**Mg**) soluble dans l'eau: 1,20 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDDHSA: 1,75 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec DTPA: 2,20 % p/p
- Molybdène (**Mo**) soluble dans l'eau: 0,09 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 1,30 % p/p

CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Micro Combi est un poudre soluble obtenue par atomisation d'une suspension liquide formée de micro-éléments totalement chélatés. Son mode de fabrication lui confère une structure fine et homogène qui garantit une solubilité totale.

Micro Combi est recommandé pour prévenir et corriger les diverses carences d'oligo-éléments en horticulture, fruiticulture et autres cultures en général.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé pour application foliaire.



- Application au sol.



- Particulièrement indiqué pour la fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 250 g/hl
3 - 5 kg/ha

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

ENGRAIS CE

MÉLANGE DE MICRO-ÉLÉMENTS CHÉLATÉS

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Bore (**B**) soluble dans l'eau: 0,50 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 0,25 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDTA: 6,20 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 0,85 % p/p
- Molybdène (**Mo**) soluble dans l'eau: 0,20 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 0,80 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5

CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Combi 22 est une poudre soluble obtenue par atomisation d'une suspension liquide formée de micro-éléments totalement chélatés.

Son mode de fabrication lui confère une structure fine et homogène qui garantit une solubilité totale.

Combi 22 est particulièrement indiqué pour la correction de diverses carences en oligo-éléments en horticulture, fruiticulture et autres cultures en général.

MODE D'EMPLOI



- Produit particulièrement recommandé en application foliaire.



- Recommandé pour les applications au sol et en fertirrigation.



- Comme apport de micro-éléments pour cultures hydroponiques.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

150 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

ENGRAIS CE

MÉLANGE DE MICRO-ÉLÉMENTS CHÉLATÉS DE HAUTE CONCENTRATION

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Bore (**B**) soluble dans l'eau: 0,46 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 0,22 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDTA: 7,10 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 3,30 % p/p
- Molybdène (**Mo**) soluble dans l'eau: 0,20 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 0,50 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5

CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Combi 70 est une poudre soluble obtenue par atomisation d'une suspension liquide formée de micro-éléments totalement chélatés.

Son mode de fabrication permet d'obtenir un produit avec une structure homogène, qui garantit une solubilité totale. **Combi 70** est une formulation spéciale de haute concentration.

Combi 70 est recommandé pour la correction de diverses carences en oligo-éléments en horticulture, fruiticulture et autres cultures en général.

MODE D'EMPLOI



- Produit particulièrement recommandé en application foliaire.



- Recommandé pour les applications au sol et en fertirrigation.



- Comme apport de micro-éléments pour cultures hydroponiques.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 200 g/hl
3 - 5 kg/ha

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 200 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

80 - 100 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

80 - 100 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

100 - 150 g/hl
1,5 - 3 kg/ha

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

ENGRAIS CE

MÉLANGE DES MICRO-ÉLÉMENTS CHÉLATÉS

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 0,24 % p/p
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDTA: 6,77 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 2,94 % p/p
- Molybdène (**Mo**) soluble dans l'eau: 0,20 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 0,85 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5

CARACTÉRISTIQUES

Produit autorisé en agriculture biologique.

Poudre soluble obtenue par atomisation d'une suspension liquide de micro-éléments totalement chélatés. Ce mode de fabrication permet d'obtenir un produit avec une structure homogène de haute concentration et totalement soluble. Produit recommandé pour la prévention et la correction de multiples carences, et pour la préparation de solutions nutritives **où la présence de Bore n'est pas souhaitée.**

MODE D'EMPLOI



- Produit particulièrement recommandé en application foliaire.



- Recommandé pour les applications au sol et en fertirrigation.



- Comme apport de micro-éléments pour cultures hydroponiques.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



FOLIAIRE CARENCE LÉGÈRE:	100 - 150 g/hl
FOLIAIRE CARENCE FORTE:	150 - 200 g/hl
FERTIRRIGATION CARENCE LÉGÈRE:	1,5 - 3 kg/ha
FERTIRRIGATION CARENCE FORTE:	3 - 5 kg/ha

Agrumes



FOLIAIRE CARENCE LÉGÈRE:	100 - 150 g/hl
FOLIAIRE CARENCE FORTE:	150 - 200 g/hl
FERTIRRIGATION CARENCE LÉGÈRE:	1,5 - 3 kg/ha
FERTIRRIGATION CARENCE FORTE:	3 - 5 kg/ha

Vigne Fraises



FOLIAIRE CARENCE LÉGÈRE:	100 - 150 g/hl
FOLIAIRE CARENCE FORTE:	150 - 200 g/hl
FERTIRRIGATION CARENCE LÉGÈRE:	1,5 - 3 kg/ha
FERTIRRIGATION CARENCE FORTE:	3 - 5 kg/ha

Horticulture



FOLIAIRE CARENCE LÉGÈRE:	100 - 150 g/hl
FOLIAIRE CARENCE FORTE:	150 - 200 g/hl
FERTIRRIGATION CARENCE LÉGÈRE:	1,5 - 3 kg/ha
FERTIRRIGATION CARENCE FORTE:	3 - 5 kg/ha

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

ENGRAIS CE

MÉLANGE DE MICRO-ÉLÉMENTS CONTENANT

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDTA: 2,90 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 2,90 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 1,05 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 1,05 % p/p
- Bore (**B**) (acide borique): 0,49 % p/p
- Molybdène (molybdate d'ammonium): 0,08 % p/p
- Magnésium (**MgO**): 3,90 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5

CARACTÉRISTIQUES

Produit particulièrement indiqué pour la viticulture.

Combi Uve est obtenu par atomisation, mode de fabrication qui permet d'obtenir une formulation de solubilité élevée.

Combi Uve est une formulation étudiée pour apporter micro-éléments et magnésium, éléments indispensables pour obtenir un raisin de qualité. En particulier, le magnésium intervient dans la synthèse des sucres.

La carence en magnésium se manifeste sur les feuilles les plus âgées, et sur les grappes. Elle provoque aussi le dessèchement des racines.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé par voie foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE: 150 - 200 g/hl
(au stade de fermeture de la grappe)

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

ENGRAIS CE

MÉLANGE DE MICRO-ÉLÉMENTS CONTENANT DU MgO

Composition:

- Formulation poudre soluble contenant:
- Fer (**Fe**) chélaté avec EDTA: 3,90 % p/p
- Manganèse (**Mn**) chélaté avec EDTA: 1,90 % p/p
- Zinc (**Zn**) chélaté avec EDTA: 3,90 % p/p
- Cuivre (**Cu**) chélaté avec EDTA: 0,05 % p/p
- Bore (**B**) (acide borique): 1,50 % p/p
- Molybdène (molybdate d'ammonium): 0,05 % p/p
- Magnésium (**MgO**): 2 % p/p
- Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée: 4-7,5

CARACTÉRISTIQUES

Produit particulièrement indiqué dans les premières phases végétatives.

Bloomcombi se présente sous forme de poudre soluble obtenue par atomisation, mode de fabrication qui permet d'obtenir une excellente solubilité de la poudre.

Bloomcombi est développé pour fournir ces éléments, en particulier le bore et le zinc, nécessaires à la bonne formation des organes de la reproduction.

Aussi permet-il de favoriser une bonne floraison et d'obtenir une bonne formation du fruit.

En viticulture et fruiticulture, utiliser le **Bloomcombi** en post-récolte avant la chute des feuilles de façon à obtenir une bonne absorption du produit avec pour objectif d'améliorer la floraison l'année suivante.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé par voie foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



POST-FLORAISON:
POST-RÉCOLTE:

100 - 150 g/hl
120 - 200 g/hl

Agrumes



PRE-FLORAISON:
POST-FLORAISON:

100 - 150 g/hl
100 - 150 g/hl

Vigne



PRE-FLORAISON:
POST-FLORAISON:

100 - 150 g/hl
100 - 150 g/hl

Horticulture



PRE-FLORAISON:
POST-FLORAISON:

100 - 150 g/hl
100 - 150 g/hl

Oliviers



PRE-FLORAISON:
POST-FLORAISON:

100 - 150 g/hl
100 - 150 g/hl

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 10 sacs de 1 kg ou boîtes de 4 sacs de 5 kg.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE



ENGRAIS CE

MICRO-GRANULÉS SOLUBLES ENGRAIS NK 3-20 AVEC FER (Fe)

Composition:

· Azote (N) total:.....	3 %
· Azote (N) uréique:.....	3 %
· Oxyde de potassium (K ₂ O) soluble dans l'eau:.....	20 %
· Fer (Fe) soluble dans l'eau:.....	6,4%
· Fer (Fe) chélaté avec EDDHSA:	5,2%
· Agent chélatant du fer: EDDHSA	
· Plage de pH qui garantit une bonne stabilité de la fraction chélatée:	4 - 10

CARACTÉRISTIQUES

Fenk est indiqué dans la prévention et la correction des maladies dues à une carence en fer (chlorose ferrique).

Fenk est une nouvelle formulation NK contenant du fer chélaté EDDHSA de concentration élevée.

L'agent chélatant EDDHSA permet d'obtenir la maximum de fer dans la position ortho-ortho, isomère qui permet d'obtenir la meilleure stabilité et une efficacité agronomique accrue du fer chélaté.

La présence d'azote, et spécialement de potassium dans la formulation, complète l'action nutritionnelle et améliore l'absorption du fer.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application au sol par pal-injecteur.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



JEUNES PLANTS:	30 - 60 g/pied
PLANTS EN PRODUCTION:	60 - 120 g/pied

Agrumes



JEUNES PLANTS:	30 - 60 g/pied
PLANTS EN PRODUCTION:	100 - 200 g/pied

Vigne



JEUNES PLANTS:	15 - 30 g/pied
PLANTS EN PRODUCTION:	30 - 50 g/pied

Fraises



TRAITEMENT PRÉVENTIF:	0,5 g/pied
TRAITEMENT CURATIF:	1 - 1,5 g/pied

Horticulture



JEUNES PLANTS:	2 - 4 g/m ²
PLANTS EN PRODUCTION:	2 - 4 g/m ²

Fleurs Plantes d'ornement



JEUNES PLANTS:	2 - 4 g/m ²
PLANTS EN PRODUCTION:	2 - 4 g/m ²

CONDITIONNEMENTS

Boîtes de 4 sacs de 5 kg.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS CE

ENGRAIS POTASSIQUE EN SOLUTION AQUEUSE RAPIDEMENT ABSORBÉ PAR VOIE FOLIAIRE ET RADICULAIRE

Composition:

- Azote (N) total: 3 % p/p
- Potassium (K₂O): 21 % p/p
- Formulation: liquide

CARACTÉRISTIQUES

Le potassium contenu dans **Frutos K** est totalement disponible et assimilable par la plante.


Cette formulation spéciale facilite l'absorption foliaire.

Le potassium apporté par **Frutos K** pendant la période végétative accentue la coloration (maturation précoce); il augmente la teneur en sucres, le calibre et la régularité des fruits.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



EPOQUE: A la fin du grossissement du fruit
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 15 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 2 - 4

Vigne



EPOQUE: Mûrissement
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 15 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 2 - 4

Agrumes



EPOQUE: Mûrissement
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 15 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 1 - 3

Oliviers



EPOQUE: A la fin du grossissement du fruit
APPLICATION FOLIAIRE: 140 - 200 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 3 - 4

Horticulture Fraises



EPOQUE: Grossissement du fruit
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 15 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 2 - 4

Cultures Industrielles



EPOQUE: A la fin du grossissement du fruit
APPLICATION FOLIAIRE: 180 ml/hl
NOMBRE D'APPLICATIONS: 3 - 4

Fleurs (fleurs coupées)



EPOQUE: Pré-floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 70 - 140 ml/hl
FERTIRRIGATION: 8 - 10 l/ha
NOMBRE D'APPLICATIONS: 2 - 4

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS ORGANIQUE MINÉRAL NPK 12-4-4 EN SUSPENSION

Composition:

· Azote (N) total:	12 % p/p
· Azote (N) organique:	1 % p/p
· Azote (N) uréique:	11 % p/p
· Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅):	4 % p/p
· Potassium (K ₂ O):	4 % p/p
· Carbone organique d'origine biologique:	3 % p/p
· Formulation:	liquide

CARACTÉRISTIQUES

Frutosprint est un engrais spécialement développé pour fournir aux cultures l'apport nécessaire au développement végétatif. Il permet d'accumuler les réserves indispensables pour une bonne floraison l'année suivante.

Frutosprint est riche en azote uréique immédiatement absorbé par les feuilles et rapidement utilisé par les plantes. Il apporte aussi d'importants acides aminés d'origine végétale qui stimulent la croissance. Il contient enfin du phosphore et du potassium, indispensables à une croissance équilibrée des cultures, et qui empêchent tout dommage dû à un excès d'azote.

Frutosprint contient une solution spéciale d'un sel potassique de l'EDTA.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application foliaire.

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

DOSE D'EMPLOI

**Pommiers,
Poiriers, Agrumes**



EPOQUE: En pré-floraison et en post récolte
APPLICATION FOLIAIRE: 270 - 300 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

**Pêches, Abricots
Nectarines**



EPOQUE: En pré-floraison et en post récolte
APPLICATION FOLIAIRE: 220 - 270 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

**Vigne et
Olives**



EPOQUE: En pré-floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 150 ml/hl
FERTIRRIGATION: 22 - 45 l/ha

**Horticulture
sous serre**



EPOQUE: Après repiquage et jusqu'à la floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 150 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

**Horticulture de
plein champ**



EPOQUE: Après repiquage et jusqu'à la floraison
APPLICATION FOLIAIRE: 200 - 230 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

Plantes d'ornement



EPOQUE: Pendant les premières phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 150 - 180 ml/hl
FERTIRRIGATION: 22 - 45 l/ha

Pelouses



EPOQUE: Après la coupe
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 180 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 23 l/ha

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS ORGANIQUE MINÉRAL NPK 4-12-4 EN SUSPENSION À FAIBLE TENEUR EN CHLORE

Composition:

· Azote (N) total:	4	% p/p
· Azote (N) organique:	1,1	% p/p
· Azote (N) ammoniacal:	1,1	% p/p
· Azote (N) uréique:	1,8	% p/p
· Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅):	12	% p/p
· Potassium (K ₂ O):	4	% p/p
· Carbone organique d'origine biologique:	3	% p/p
· Formulation:	liquide	

CARACTÉRISTIQUES

Frutostarter est un engrais liquide spécialement formulé pour favoriser les phases de floraison et de fructification.

Frutostarter est particulièrement riche en phosphore rapidement assimilable, qui favorise la floraison, la fécondation et la fructification.

Frutostarter est aussi riche en azote et potassium, indispensables pour une croissance équilibrée des cultures.

Frutostarter contient de l'urée qui est rapidement absorbée et utilisée par les plantes.

Il contient aussi des acides aminés d'origine végétale qui stimulent la croissance.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Pommiers, Poiriers, Agrumes



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
270 - 300 ml/hl
45 - 60 l/ha

Pêches, Abricots Nectarines



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
220 - 270 ml/hl
45 - 60 l/ha

Vigne et Olives



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
100 - 150 ml/hl
22 - 45 l/ha

Horticulture sous serre



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
100 - 150 ml/hl
45 - 60 l/ha

Horticulture de plein champ



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
200 - 230 ml/hl
45 - 60 l/ha

Plantes d'ornement



EPOQUE:
APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

En pré-floraison
150 - 180 ml/hl
22 - 45 l/ha

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES
NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

NPK 5-5-5. ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL EN SUSPENSION

Composition:

· Azote (N) total:	5,5 % p/p
· Azote (N) organique:	1 % p/p
· Azote (N) uréique:	4 % p/p
· Anhydride phosphorique (P ₂ O ₅):	5,5 % p/p
· Potassim (K ₂ O):	5,5 % p/p
· Carbone organique d'origine biologique:	3 % p/p
· Formulation:	liquide

CARACTÉRISTIQUES

Frutostar est un engrais liquide spécialement formulé pour favoriser une croissance régulière des cultures dans toutes les phases de leur développement. Il contient de l'azote uréique immédiatement absorbé par les feuilles et rapidement utilisé par les végétaux.

Frutostar apporte aussi d'importants acides aminés d'origine végétale qui stimulent la croissance. En plus de l'azote, **Frutostar** contient du phosphore et du potassium dans des proportions équilibrées qui garantissent une nutrition optimale des cultures.

MODE D'EMPLOI



- Application par fertirrigation.



- Application foliaire.

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

DOSE D'EMPLOI

Pommiers, Poiriers, Agrumes



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 270 - 300 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

Pêches, Abricots Nectarines



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 220 - 270 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

Vigne et Olives



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 150 ml/hl
FERTIRRIGATION: 22 - 45 l/ha

Horticulture sous serre



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 150 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

Horticulture de plein champ



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 200 - 230 ml/hl
FERTIRRIGATION: 45 - 60 l/ha

Plantes d'ornement



EPOQUE: Pendant toutes les phases de croissance
APPLICATION FOLIAIRE: 150 - 180 ml/hl
FERTIRRIGATION: 22 - 45 l/ha

Pelouses



EPOQUE: Après la coupe
APPLICATION FOLIAIRE: 100 - 180 ml/hl
FERTIRRIGATION: 10 - 23 l/ha

ENGRAIS CE

ENGRAIS MINERAL

Composition:

Engrais liquide PK 19-18 à basse teneur en chlore:

- Anhydride phosphorique (P_2O_5): 19 % p/p
- Oxyde de potassium (K_2O): 18 % p/p
- Formulation: liquide

CARACTÉRISTIQUES

Actiron K apporte du phosphore et du potassium sous une forme rapidement assimilable par la plante.

Sa composition spécifique permet son utilisation tant au sol que par voie foliaire. Par sa teneur élevée et équilibrée en phosphore et potassium, **Actiron K** permet un développement harmonieux de la plante.

Une application régulière du produit favorise la stimulation des défenses naturelles de la plante.

Actiron K contient des dérivés phosphonés.

MODE D'EMPLOI

Son utilisation est recommandée comme suit:



• APPLICATION FOLIAIRE.

Lors de la phase de pleine activité végétative en mouillant la plus grande surface possible de la plante.



• APPLICATION EN FERTIRRIGATION.

Application localisée lors des premières phases végétatives.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl
(2 à 3 fois minimum)

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl
(2 à 3 fois minimum)

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl
(2 à 3 fois minimum)

UTILISATION LOCALISÉE: 7 - 10 l/ha à chaque application
(3 fois minimum)

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl
(2 à 3 fois minimum)

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl
(2 à 3 fois minimum)

Pépinières



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 250 ml/hl

UTILISATION LOCALISÉE: 7 - 10 l/ha à chaque application
(3 fois minimum)

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES
NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS CE

Composition:

SOLUTION DE SEL DE CUIVRE 3 % (sulfate de cuivre)

CARACTÉRISTIQUES

Actiron Cupro est une nouvelle formulation à la base de sel de cuivre de basse concentration. La particularité de cette formulation est qu'elle permet une absorption très rapide par les tissus végétaux, et favorise la stimulation des défenses naturelles de la plante. Le cuivre, outre ses propriétés fongiques et bactériostatiques, est un important micro-élément indispensable pour la vie des plantes ; il joue un rôle important dans la synthèse de la chlorophylle et d'autres pigments, et intervient dans la synthèse des carbohydrates et des protéines. La carence en cet élément se rencontre en général dans les terrains à pH élevé et riches en phosphore.

Actiron Cupro contient des dérivés phosphonés.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé en application foliaire.

Dans le cas de mélange avec des produits à base de cuivre, tenir compte de la teneur en cuivre de Actiron Cupro.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

80 - 150 ml/hl

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 230 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 230 ml/hl

Oliviers



APPLICATION FOLIAIRE:

150 - 230 ml/hl

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:

80 - 110 ml/hl

Pépinières



APPLICATION FOLIAIRE:

80 - 110 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE



ENGRAIS CE

SOLUTION D'ENGRAIS NP CONTENANT DU CUIVRE ET DU SOUFRE

Composition:

· Azote (N) total:.....	9,24 % p/p
· Azote (N) uréique:.....	5,34 % p/p
· Azote (N) ammoniacal:	3,9 % p/p
· Phosphore (P ₂ O ₅):	8,8 % p/p
· Cuivre (Cu):	3,26 % p/p
· Anhydride sulfureux (SO ₃) soluble dans l'eau:.....	53 % p/p
· Formulation: liquide	

CARACTÉRISTIQUES

Actiron Sulfo apporte de l'azote et du phosphore en quantités équilibrées, favorisant un développement régulier de la plante dans toutes les phases de sa croissance.

Le cuivre, micro-élément qui joue un rôle important dans les processus de respiration, intervient aussi dans la synthèse des pigments.

Le soufre, oligo-élément lié au métabolisme de l'azote, est aussi un constituant essentiel de nombreux acides aminés importants.

Actiron Sulfo contient des dérivés phosphonés.

MODE D'EMPLOI



- Recommandé en application foliaire.

DOSE D'EMPLOI

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:

170 - 200 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

130 - 170 ml/hl

Céréales



APPLICATION FOLIAIRE:

200 - 240 ml/hl

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL AZOTÉ EN SUSPENSION

Composition:

· Azote (N) total:.....	13 % p/p
· Azote (N) organique:.....	2 % p/p
· Azote (N) ammoniacal:.....	2 % p/p
· Azote (N) uréique:.....	9 % p/p
· Carbone (C) organique d'origine biologique:.....	15 % p/p
· Formulation: liquide	

CARACTÉRISTIQUES

L'azote présent sous plusieurs formes optimise l'efficacité des unités fertilisantes utilisées, en facilitant l'absorption des autres substances nutritives, en activant le développement de la plante, en aidant à la croissance du fruit et en améliorant la fertilité des bourgeons.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

160 - 200 ml/hl

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

160 - 200 ml/hl

Oliviers



APPLICATION FOLIAIRE:

160 - 200 ml/hl

Horticulture (fruits)



APPLICATION FOLIAIRE:
APPLICATION FERTIRRIGATION:

160 ml/hl
5 l/1000 m²

Maraichage (laitue)



APPLICATION FOLIAIRE:

120 - 160 ml/hl

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:

5 l/ha
(minimum 1000 l d'eau)

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS AVEC ACIDES AMINÉS D'ORIGINE VÉGÉTALE

Composition:

- Azote (N) total: 6 % p/p
- Acides aminés totaux: 14 % p/p
- Formulation: liquide

CARACTÉRISTIQUES

Aminostar est une solution naturelle d'origine 100 % végétale qui s'emploie comme catalyseur de la nutrition et de la croissance. Il contient des éléments primaires et secondaires, des micro-éléments, des acides aminés, des hydrates de carbone, des hormones végétales et des vitamines naturellement présentes dans les extraits végétaux.

Le produit:

- Est capable d'intervenir dans les processus biochimiques du développement de la plante en facilitant l'absorption et le transfert des éléments nutritionnels
- Il favorise l'activité enzymatique et la synthèse protéique
- Il augmente la croissance végétale grâce à la présence de thréonine
- Il accélère la photosynthèse grâce à la présence de glycine
- Il stimule la synthèse des substances hormonales
- Il stimule la respiration grâce à la présence d'alanine
- Il réduit les dommages dus aux gelées
- Il stimule la maturation

Ces propriétés permettent d'améliorer la qualité des fruits et des légumes, et favorisent la précocité des floraisons et récoltes.

Aminostar accélère aussi la décomposition des déchets ce qui réduit la présence de maladies dans le sol. Enfin, **Aminostar** permet une réduction des doses de produits de traitement et d'engrais par son pouvoir véhiculant élevé.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

160 - 200 ml/hl
4 - 8 l/ha
(en deux fois)

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

160 - 200 ml/hl
4 - 8 l/ha
(en deux fois)

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

160 - 200 ml/hl
4 - 8 l/ha
(en deux fois)

Fraises



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

200 ml/hl
4 - 8 l/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

160 - 240 ml/hl
4 - 8 l/ha

Fleurs Plantes d'ornement



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

160 - 240 ml/hl
4 - 8 l/ha

Cultures Industrielles



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

3 - 4 l/ha
4 - 8 l/ha

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES
NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE



ENGRAIS ORGANIQUE AZOTÉ

EXTRAIT FLUIDE DE LEVURES À BASE D'ALGUES BRUNES

Composition:

- Carbone (C) organique total d'origine biologique: 10 % p/p
- Azote (N) organique total d'origine biologique: 1,5 % p/p
- Matière organique totale: 30 % p/p
- Extrait d'algues du type ASCOPHILLUM NODOSUM: 13 % p/p
- Formulation: liquide

CARACTÉRISTIQUES

Algaprox est riche en auxines et cytokinines présentes sous forme naturelle.


Algaprox se caractérise par la présence d'acides HUMIQUES et FULVIQUES et d'acides aminés d'origine végétale qui complètent et augmentent l'action du produit.

L'application régulière d'**Algaprox** favorise un développement équilibré de l'appareil foliaire, stimule le développement des racines, réduit les dommages des gelées.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

80 - 120 ml/hl
2 - 3 l/ha

Vigne et Olives



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

80 - 120 ml/hl
2 - 3 l/ha

Horticulture



APPLICATION FOLIAIRE:
FERTIRRIGATION:

80 - 160 ml/hl
2 - 3 l/ha

CONDITIONNEMENTS

Bidons de 1 l, 5 l et 20 l.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

ENGRAIS ORGANIQUE AZOTÉ D'ORIGINE VÉGÉTALE

EXTRAITS HUMIQUES DE BAGASSES ET DE BETTERAVES AVEC UNE CONCENTRATION ÉLEVÉE EN ACIDES FULVIQUES.

Composition:

· Matière organique totale:.....	80 % p/p
· Matière organique sur extrait sec:	83 % p/p
· Matière organique humique en % de la matière organique:.....	60 % p/p
· Azote (N) organique sur extrait sec:	2 % p/p
· Ratio C/N:.....	24
· Moyen d'extraction:	KOH


CARACTÉRISTIQUES

Formulation en poudre soluble de pH 4.5, **Vitalgan** contient de la matière organique qui se minéralise rapidement, des éléments primaires et secondaires, des oligo-éléments ainsi que diverses substances bio-stimulantes naturellement présentes dans sa composition, en particulier une teneur élevée en acides fulviques (70 %); ces derniers facilitent la mise à disposition des éléments nutritionnels, action utile surtout dans les moments critiques d'absorption de ceux-ci par le système racinaire.

MODE D'EMPLOI



- Application foliaire.



- Application par fertirrigation.

DOSE D'EMPLOI

Vergers



APPLICATION FOLIAIRE:

250 g/hl

FERTIRRIGATION:

30 kg/ha
en deux fois

Agrumes



APPLICATION FOLIAIRE:

250 g/hl

FERTIRRIGATION:

30 kg/ha
en deux fois

Vigne



APPLICATION FOLIAIRE:

250 g/hl

FERTIRRIGATION:

30 kg/ha
en deux fois

Horticulture sous serre



FERTIRRIGATION:

2 kg/1000 m²
à chaque application

Horticulture de plein champ



FERTIRRIGATION:

15 kg/ha
à chaque application

CONDITIONNEMENTS

Sacs de 5 kg et 25 kg.

IL EST RECOMMANDÉ DE NE PAS DÉPASSER LES DOSES CONSEILLÉES

NOTES ET OBSERVATIONS SUR LA COMPATIBILITÉ EN FIN DU CATALOGUE

VITAFIXOL world wide

FRANCE

SYNTHRON

92305 Levallois-Paris
Tel.: 33 (0) 141341400 • Fax: 33 (0) 141341416
postmaster@protex-international.com

ALLEMAGNE

PROTEX EXTROSA

D-79504 Lörrach
Tel.: (49) 07621/84772 • Fax: (49) 07621/12429

ESPAGNE

QUIMOPROX S.L.

08187 Santa Eulalia De Roncana, Barcelona
Tel.: (34) 938446694 • Fax: (34) 938447737

ITALIE

PROXITALIA PRODOTTI CHIMICI S.r.l.

20043 Arcore (MI) • Via Alfonso Casati, 49
Tel.: (39) 039 6012175 • Fax: (39) 039 6188369
proxitalia@proxitalia.it

PORTUGAL

PROX LDA

4470 Maia
Tel.: (351) 229415019 • Fax: (351) 229415022

GRANDE-BRETAGNE

PROTEX CHEMICALS Ltd

Howley Park Road East, Morley,
Leeds, LS 27 OSW
Tel.: (44) 01132383222 • Fax: (44) 01132383111
sales@protexchemicals.com

SUÈDE

PROTEX SVERIGE AB

Göteborg
Tel.: (46) 53110314 • Fax: (46) 53110314

SLOVÉNIE

ZELENI HIT d.o.o.

Savlje 90 A, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (1) 5800057 • Fax: +386 (1) 5800059

GRÈCE

AGROSEM E.ME

Kolokotroni 5, 42100 Trikala
Tel.: (30) 2431022569 • Fax: (30) 2431023515

SUISSE

PROTEX CHIMIE S.A.

Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz (CH)
Tel.: (41) 061302066 • Fax: (41) 061302076

ETATS UNIS

PROX-CHEM AMERICA Inc.

1077 13th Street SE, Hickory NC 28602
Tel.: (1) 828 4498555 • Fax: (1) 828 3227003
randy@proxcheminc.com

HONG-KONG

PROXASIA Ltd

Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Tel.: (852) 24075699 • Fax: (852) 24087185
proxasia@netvigator.com

CORÉE DU SUD

PROTEX KOREA Co Ltd

661-32 Yeoksam-Dong-Kamgnam-Ku-Seul, 135-080
Tel.: (82) 02 34538213 • Fax: (82) 02 34538082
yklee@protexkorea.co.kr

THAÏLANDE

THAIPROX Ltd

Klongtoey - Bangkok 10110
Tel.: (66) 2 254-9562/656-9568-9
Fax: (66) 2 254-9563
pga@thaiprox.co.th

CHINE

SUZHOU PROX-CHEM

Specialty Chemicals Co, Ltd - 30 Xi Yuan Road
Suzhou Jiangsu - 215008
Tel.: (86) 51265321636 • Fax: (86) 51265320906

MAROC

SPECHIMA

20600 Casablanca - Ain Sebaa
Tel.: 21222356507/21222343498
Fax: 21222359240
spechima@menara.ma

Compatibilité: les produits sont compatibles avec la plupart des produits phytosanitaires, à l'exception des produits de réaction alcaline (par exemple: huile).
Dans tous les cas, effectuer des essais préliminaires de compatibilité avant utilisation.

Note: la responsabilité du fournisseur est limitée à la fourniture de produits conformes à la composition déclarée sur l'emballage d'origine.
Le fabricant ne peut pas être tenu responsable de la façon dont les produits sont utilisés par le client.

N.B. Les informations contenues dans ce catalogue sont simplement indicatives.
QUIMOPROX, S.L. se réserve le droit d'effectuer à tout moment et sans avertissement préalable les modifications considérées comme nécessaires à toute exigence technique, commerciale et/ou légale.

